

トービイ®吸入液300mgを使用される患者さんへ

安全にご使用いただくために

本剤を適正にご使用いただくために、以下に記載された事項をお守りください。

使用時の注意

- 医師に指示された用法・用量を守って吸入してください。
- ネブライザーによる吸入以外の方法で使用しないでください。
- 吸入には原則としてバリ・LCプラスネブライザーおよびプロモエイドコンプレッサーを使用してください。
- ネブライザーおよびコンプレッサーは各製品の取扱説明書に従って使用し、適切に管理してください。
- トービイの吸入間隔はできる限り12時間、少なくとも6時間以上あけてください。
- 気管支を拡張するお薬等の吸入、肺理学療法を行う場合は、これらのお薬の吸入療法のとで、トービイを吸入してください。
- アンプルは使用直前に開封し、1回で使い切ってください。開封したアンプルは再利用しないで捨ててください。

保管上の注意

- 凍結を避けて、冷蔵庫(2~8℃)で保管してください。
- 未使用のアンプルは、光を避けるため、必ずアルミ袋に保管してください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 薬液ににごりや異物がある場合は使用しないでください。
- 室温(25℃以下)で28日以上保管したものやアンプルに印字された使用期限が過ぎたものは使用しないでください。

使用方法

1.吸入に必要なもの



トービイ®吸入液300mg



バリ・LCプラスネブライザー



プロモエイドコンプレッサー




送気ホース



鼻クリップ(任意)

2.吸入の準備

- 1 石鹸と水で十分に手を洗います。
- 2 アルミパックを開封し、1回分のアンプルを取り出します。
- 3 アンプルの上部をねじり切って開封します。
薬液がこぼれる可能性があるためアンプルを強く押さないように注意してください。
- 4 ネブライザーにアンプル内の薬液を全て搾り出します。
ネブライザーの取扱説明書に従ってご使用ください。
- 5 コンプレッサーを準備し、ネブライザーとコンプレッサーを接続します。
コンプレッサーの取扱説明書に従ってご使用ください。



3.吸入方法

- 1 コンプレッサーのスイッチを入れ、マウスピースから霧状の薬液が出ていることをしっかり確認します。
霧状の薬液が出てこない場合は、接続やコンプレッサーの作動を確認してください。
- 2 自然な呼吸ができる姿勢をとります。
座位または直立の姿勢で吸入してください。
- 3 マウスピースをくわえ、口だけで自然に呼吸します。
鼻クリップを使うと口呼吸を容易にすることができます。
ネブライザーの取扱説明書に従ってご使用ください。
- 4 霧状になった薬液がネブライザーから出なくなるまで約15分かけて吸入します。



4.洗浄と保管

吸入後のネブライザーとコンプレッサーの洗浄・消毒については、各製品の取扱説明書を参照してください。

トービイQ&A

Q 吸入し忘れてしまったらどうしたらよいですか?

A 次の吸入の6時間以上前ならすぐに吸入しましょう。そうでなければ次の吸入時間まで待ち、吸入し忘れた分は追加せずに、1回分を吸入しましょう。

Q 他にも吸入するお薬が処方されていますが、混ぜて吸入してもよいですか?

A 混ぜずに吸入してください。

●疑問点や質問等がある場合には医師または薬剤師にご相談ください。

バルティス ファーマ 株式会社